



ADP

AGRONEGOCIOS DEL PLATA

ALIMENTOS BALANCEADOS

Bovinos de Carne

www.adp.com.uy

 4534 3370*

Ruta 6 km 328. Caraguatá



NOMBRE	DESTETE PRECOZ 21%	DESTETE PRECOZ 18%	DESTETE PRECOZ 18% FIBRA	RECRÍA 16 %	RECRÍA 16% FIBRA	RECRÍA 16 % AUTOCONSUMO SAL	RECRÍA 14 %	RECRÍA 14 % FIBRA	RECRÍA 14 % AUTOCONSUMO SAL	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO FIBRA
--------	--------------------	--------------------	--------------------------	-------------	------------------	-----------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	---------------	---------------------

Composición nutricional

Máxima humedad	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
Mínimo proteína	21%	18%	18%	16%	16%	16%	14%	14%	14%	11%	11%
Máximo fibra	7%	7%	9,5%	6%	7,6%	5%	5%	9%	4,5%	4,3%	7,9%
Máximo ceniza	6,3%	7%	8%	6%	7,5%	15%	5,3%	7%	15%	6%	8%
Extracto etéreo mín.	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Máximo NaCL	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	11%	0,5%	0,5%	11%	0,5%	0,5%
Máximo Ca	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Mínimo Ca	0,6%	0,6%	0,6%	0,6 %	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Máximo P	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Mínimo P	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Máximo úrea	0%			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Máximo DON 5 ppm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alimento medicado con monensina	Ionóforo 29 Mg/kg	Ionóforo 29 Mg/kg	Ionóforo 29 Mg/kg	Ionóforo 35,4 Mg/kg	Ionóforo 35,4 Mg/kg	Ionóforo 36,1 Mg/kg	Ionóforo 35,4 Mg/kg	Ionóforo 35,4 Mg/kg	Ionóforo 36,1 Mg/kg	Ionóforo 11,6 Mg/kg	Ionóforo 11,6 Mg/kg

Uso	DESTETE PRECOZ 21%	DESTETE PRECOZ 18%	DESTETE PRECOZ 18% FIBRA	RECRÍA 16 %	RECRÍA 16% FIBRA	RECRÍA 16 % AUTOCONSUMO SAL	RECRÍA 14 %	RECRÍA 14 % FIBRA	RECRÍA 14 % AUTOCONSUMO SAL	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO FIBRA
Uso	Para terneros a partir de 35 días en adelante, alimento con alta concentración, energía y proteína de origen vegetal se recomienda suministrar 1% a 2,5% de peso vivo por día, en comederos. Suministrar en comederos.	Para terneros a partir de 60 días de edad con alto nivel de proteína vegetal se recomienda suministrar 1% a 2% de peso vivo por día, según oferta forrajera. Suministrar en comederos.	Para terneros de a partir de 60 días de edad, con fibra incorporada suministrar de 2,5% a 4% de peso vivo por día, con un período de acostumbramiento previo, utilizando comederos de autoconsumo o encierro total. Suministrar en comederos autoconsumo.	Para terneros de 130kgs de peso en adelante se recomienda suministro de 1% a 2% de peso vivo por día según oferta forrajera. Suministrar en comederos.	Para terneros de 130kgs de peso vivo en adelante, con fibra incorporada suministrar 2% a 3,5% de peso vivo, con un período de acostumbramiento previo, luego en comederos de autoconsumo. Suministrar en comederos.	Para terneros 130 kgs de peso vivo en adelante suministrar 1% a 2% de peso vivo por día de acuerdo oferta forrajera. Suministrar en comederos autoconsumo.	Para terneros 180 - 200kgs de peso suministrar 1% a 2% de peso vivo por día de acuerdo oferta forrajera. Suministrar en comederos.	Para terneros 180 - 200kgs de peso en adelante, con fibra incorporada suministrar 2% a 3,5% de peso vivo por día. Suministrar en comederos autoconsumo.	Para terneros 180 -200kgs de peso en adelante suministrar 1% a 2% de peso vivo por día. Suministrar en comederos autoconsumo.	Para vacunos adultos todas las categorías con déficit forrajero suministrar 1% a 2% de peso vivo por día según oferta forrajera. Suministrar en comederos.	Para vacunos adultos toda categoría con déficit forrajero suministrar 2% a 3,5% de peso vivo por día según oferta forrajera. Suministrar en comederos.



NOMBRE	TERMINACIÓN	TERMINACIÓN FIBRA	TERMINACIÓN AUTOCONSUMO SAL	TORO CABANA
Composición nutricional				
Máxima humedad	13,5%	13,5%	13%	13,5%
Mínimo proteina	11,5%	11,5%	11,5%	15%
Máximo fibra	4%	8%	4%	5,1%
Máximo ceniza	5,5%	6,8%	15%	5%
Extracto etereo mín.	5%	5%	5%	5%
Máximo NaCL	0,5%	0,5	11	0,5
Máximo Ca	1,2%	1,2%	1,2 %	1,2 %
Mínimo Ca	0,6%	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Máximo P	0,8%	0,8%	0,8 %	0,8 %
Mínimo P	0,4%	0,4%	0,4 %	0,4 %
Máximo úrea	1%	1%	1%	1%
Máximo DON 5 ppm	✓	✓	✓	✓
Alimento medicado con monensina	Ionóforo 35,4 Mg/kg	Ionóforo 35,4 Mg/kg	Ionóforo 36,1 Mg/kg	Ionóforo 35,4 Mg/kg
Uso	Para vacunos en etapa engorde, que se encuentren sobre pasturas o campo natural. Suministrar 1,0% a 2,0% de peso vivo por día según oferta forrajera. Suministrar en comederos.	Para vacunos en etapa engorde a corral o autoconsumo suministrar 2,0% a 3,5% de peso vivo por día según oferta forrajera. Suministrar en comederos.	Para vacunos adultos en etapas de engorde sobre pasturas suministrar 1,0% a 2,0% de peso vivo por día según oferta forrajera. Suministrar en comederos autoconsumo.	Para animales en preparación para exposiciones o remates suministrar 1,5% a 2,5% de peso vivo por día. Suministrar en comederos.

Hace tu pedido
al **095 739 342**

Producido en **Uruguay**

